# « Dans la famille… »

## Troubles réfractifs

À partir de 9 mois
réfraction sous cycloplégique
(Skiacol®, atropine)

Si
– hypermétropie > 3,5 à 4 D
– myopie > 2 D
– astigmatisme > 2,5 D
– anisométropie > 1,5 D

Corriger **TOUTE** la valeur de l'amétropie retrouvée

Si mesure limite ou doute, contrôler sous cycloplégique 3 mois après

Suivi : 9 mois
18 mois
3 ans
4 ans

## Strabisme

Examen à partir de 9 mois

Pas de strabisme à examen clinique

Reflets centrés
Cover test normal
Vision stéréoscopique
+ si test possible
FO : normal

Réfraction sous cycloplégique
(Skiacol®, atropine)

Si
– hypermétropie > 3 D
– myopie > 2 D
– astigmatisme > 2,5 D
– anisométropie > 1,5 D

Corriger **TOUTE** la valeur de l'amétropie retrouvée

Si mesure limite ou doute, contrôler sous cycloplégique 3 mois après

## Maladies génétiques

### Rétiniennes

**Recherche de signes fonctionnels**

Héméralopie
Photophobie
BAV
Trouble vision des couleurs
Constriction champ visuel

**Recherche de signes cliniques**

Rétine poivre et sel ?
Vaisseaux fins ?
Pâleur rétinienne ?
Atrophie maculaire ?
Remaniement maculaire ?

– Autofluorescence + + + : recherche hypo- ou hyperautofluorescence
– OCT : respect ligne photorécepteurs ? Schisis ?
– ERG si signes cliniques

### Nerf optique (NO)

Atrophie optique Autosomique Dominante

Atrophie optique de Leber
Recherche d'antécédents du côté de la mère

Limitation AV ?
Dyschromatopsie ?
Pâleur temporale du NO ?
Atrophie temporale RNFL ?

Phase d'état : atrophie optique

Conseils
– pas de médicament toxique pour NO
– pas d'alcool à forte dose
– Pas d'association tabac-alcool

Dr Guylène Le Meur